



MÉDICAMENT GÉNÉRIQUE :  
IL A PLUSIEURS CORDES À SON ARC



EN SAVOIR +



[Accueil](#) | [Glossaire](#) | [Aide](#)

Dernière mise à jour le 03/08/2017

## SOMMAIRE

[Description médicament](#)  
[Informations](#)  
[Utilisation](#)  
[Effets indésirables](#)  
[Conservation](#)  
[Info. supplémentaires](#)

## Fiche info

## Résumé des caractéristiques du produit

## Notice

### IBUPROFENE URGO 5 %, gel - Notice patient



ANSM - Mis à jour le : 11/05/2017

#### Dénomination du médicament

**IBUPROFENE URGO 5 %, gel**  
**Ibuprofène**

#### Encadré

**Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

- Ce médicament peut être utilisé en automédication c'est-à-dire utilisé sans consultation ni prescription d'un médecin.
- Si les symptômes persistent, s'ils s'aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent, demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.
- Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez-la, vous pourriez avoir besoin de la relire.

#### Sommaire notice

#### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE IBUPROFENE URGO 5 %, gel ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER IBUPROFENE URGO 5 %, gel ?
3. COMMENT UTILISER IBUPROFENE URGO 5 %, gel ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER IBUPROFENE URGO 5 %, gel ?
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

#### 1. QU'EST-CE QUE IBUPROFENE URGO 5 %, gel ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ? ↗

#### Classe pharmacothérapeutique

Sans objet.

#### Indications thérapeutiques

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien. Il est indiqué, chez l'adulte et l'enfant de plus de 15 ans, en traitement local de courte durée des traumatismes bénins : entorses (foulures), contusions.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER IBUPROFENE URGO 5 %, gel ? ↗

#### Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

#### Contre-indications

**N'utilisez jamais IBUPROFENE URGO 5 %, gel dans les cas suivants:**

- à partir du 6<sup>ème</sup> mois de la grossesse,
- antécédent d'allergie à ce médicament ou à un médicament apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, aspirine,
- antécédent d'allergie à l'un des excipients,
- peau lésée, quelque soit la lésion: lésions suintantes, eczéma, lésion infectée, brûlure ou plaie.

#### Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

**Faites attention avec IBUPROFENE URGO 5 %, gel:**

- Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 15 ans.
- Ce médicament est à appliquer uniquement au niveau de la région douloureuse.
- Ce médicament ne doit pas être utilisé sous pansement occlusif.
- Ne pas appliquer sur les muqueuses, ni sur les yeux.
- L'apparition d'une éruption cutanée après application du gel impose l'arrêt immédiat du traitement.
- Il est recommandé de bien se laver les mains après chaque utilisation.

En l'absence d'amélioration au bout de 5 jours ou en cas d'aggravation, il est impératif de consulter votre médecin.

#### **Interactions avec d'autres médicaments**

##### **Prise ou utilisation d'autres médicaments**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce gel contient un anti-inflammatoire non stéroïdien: l'ibuprofène.  
 Vous ne devez pas prendre en même temps que ce médicament d'autres médicaments destinés à être appliqués sur la peau contenant de l'ibuprofène et/ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens.  
 Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer de l'absence d'ibuprofène et/ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens.

#### **Interactions avec les aliments et les boissons**

Sans objet.

#### **Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives**

Sans objet.

#### **Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement**

##### **Grossesse**

Ce médicament ne sera utilisé pendant les 5 PREMIERS MOIS de la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

A partir du 6<sup>ème</sup> mois de la grossesse, vous ne devez EN AUCUN CAS prendre de VOUS MEME ce médicament. Bien que le passage de ce médicament dans la circulation générale soit faible, il ne peut être exclu. Dans ce cas, l'effet de ce médicament sur votre enfant pourrait avoir des conséquences graves, notamment au plan cardio-pulmonaire et rénal, et cela, même avec une seule application. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

##### **Allaitement**

Les A.I.N.S passant dans le lait maternel, par mesure de précaution, il convient d'éviter de les administrer chez la femme qui allaite. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### **Sportifs**

Sans objet.

#### **Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines**

Sans objet.

#### **Liste des excipients à effet notoire**

Sans objet.

### **3. COMMENT UTILISER IBUPROFENE URGO 5 %, gel ? ↗**

#### **Instructions pour un bon usage**

Sans objet.

#### **Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement**

RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 15 ANS.

##### **Mode d'administration**

Voie locale.

##### **Posologie**

La posologie usuelle est de 1 application, 3 fois par jour, sur la zone douloureuse.

Faire pénétrer le gel par un massage doux et prolongé, sur la région douloureuse ou inflammatoire.

Bien se laver les mains après chaque utilisation.

##### **Durée de traitement**

Le traitement est limité à 5 jours.

#### **Symptômes et instructions en cas de surdosage**

**Si vous avez utilisé plus de IBUPROFENE URGO 5 %, gel que vous n'auriez dû:**

Rincez abondamment à l'eau.

#### **Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses**

**Si vous oubliez d'appliquer IBUPROFENE URGO 5 %, gel:**

N'appliquez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié d'appliquer.

#### **Risque de syndrome de sevrage**

Sans objet.

#### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ? ↗**

##### **Description des effets indésirables**

Comme tous les médicaments, IBUPROFENE URGO 5 %, gel est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

· *Exceptionnellement*, peuvent survenir des réactions allergiques:

- o cutanées,
- o respiratoires de type crise d'asthme,
- o générales.

Dans tous ces cas, il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.

· Peuvent survenir également:

- o des effets locaux cutanés de type rougeurs, démangeaisons,
- o d'autres effets généraux des anti-inflammatoires non stéroïdiens, fonction de la quantité de gel appliquée, de la surface traitée et de son état, de la durée de traitement et de l'utilisation ou non d'un pansement fermé.

Dans tous ces cas, avertir votre médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

#### **5. COMMENT CONSERVER IBUPROFENE URGO 5 %, gel ? ↗**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

##### **Date de péremption**

Ne pas utiliser IBUPROFENE URGO 5 %, gel après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

##### **Conditions de conservation**

Ce médicament doit être conservé à une température ne dépassant pas 30°C.

##### **Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration**

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

#### **6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES ↗**

##### **Liste complète des substances actives et des excipients**

**Que contient IBUPROFENE URGO 5 %, gel ?**

##### **La substance active est:**

Ibuprofène ..... 5,00 g  
Pour 100 g.

##### **Les autres composants sont:**

Hydroxyéthylcellulose, hydroxyde de sodium, alcool benzylique, alcool isopropylique, eau purifiée.

##### **Forme pharmaceutique et contenu**

**Qu'est-ce que IBUPROFENE URGO 5 %, gel et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de gel pour application cutanée.

Tube de 50 g ou de 60 g.

##### **Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent**

##### **Titulaire**

##### **LABORATOIRES URGO HEALTHCARE**

42 RUE DE LONGVIC  
21300 CHENOVE

##### **Exploitant**

##### **LABORATOIRES URGO HEALTHCARE**

42 RUE DE LONGVIC  
21300 CHENOVE

##### **Fabricant**

##### **LABORATOIRES URGO**

AVENUE DE STRASBOURG  
ZONE EXCELLENCE 2000  
21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR

##### **Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

##### **Date d'approbation de la notice**

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

#### **AMM sous circonstances exceptionnelles**

Sans objet.

#### **Informations Internet**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

#### **Informations réservées aux professionnels de santé**

Sans objet.

#### **Autres**

##### **CONSEILS / EDUCATION SANITAIRE**

Vous venez d'avoir un traumatisme ou une contusion, vous pouvez utiliser le gel pour soulager votre douleur, mais:

##### **En cas d'entorse de la cheville**

L'entorse bénigne ou foulure, n'entraîne pas de craquement ni de sensation de déboîtement.

La douleur initiale est vite améliorée par la mise au repos (24 h à 48 h).

L'impotence fonctionnelle est quasi inexistante, même si la marche est légèrement douloureuse. Tout signe de gravité immédiat, persistant ou apparaissant secondairement tels que: douleur pulsatile, hématome important, ecchymose plantaire du pied, doit vous amener à consulter rapidement votre médecin.

En pratique:

Si vous avez plus de 55 ans,

Si vous ne pouvez absolument pas vous mettre en appui sur la jambe pour faire quelques pas,

Ou si un hématome (bleu) apparaît dans les 24 h à 48 h ou s'il existe une déformation ou un œdème (gonflement) très important, vous devez consulter votre médecin qui seul jugera de la nécessité d'une radiographie et d'un traitement orthopédique;

##### **En cas de lésion du genou**

Si vous avez plus de 55 ans,

En cas de gonflement important du genou avec ou sans hématome et/ou d'impossibilité d'appui, vous devez aussi consulter votre médecin;

##### **Dans tous les cas**

S'il existe une impotence fonctionnelle complète, c'est-à-dire si vous ne pouvez vous servir du membre supérieur ou du membre inférieur et en cas d'hématome (« bleu ») important, vous devez aussi consulter sans tarder votre médecin.

[Retour en haut de la page](#) ↗

